



ГБУЗ «Оренбургский областной центр
медицинской профилактики»
Адрес: 460040, г. Оренбург,
ул. Алтайская, д. 12 «а»
god42@mail.orb.ru

АНО «ЦСИ «Развитие»
Адрес: 460044, г. Оренбург,
ул. Березка, д. 26, офис 2
socialinfo@yandex.ru

Гонорея: симптомы и профилактика

Гонорея – распространенное инфекционное заболевание, часто называемое триппером или перелоем. Вызывается посредством возбудителя – гонококка. Передается преимущественно половым путём, включая оральный и анальный секс. Поражает, в основном, слизистые оболочки мочеполовых органов.

Иногда у человека, имевшего половой контакт с заведомо больным гонореей, не появляется никаких признаков заболевания. Но это вовсе не значит, что он не заразился. Нужно обязательно обследоваться у врача-дерматовенеролога. Так называемое бессимптомное течение гонореи опасно как для заболевшего, так и для его партнеров.

У мужчин инкубационный период течения гонореи длится 2-15 суток. Первые симптомы гонореи появляются через 2-5 дней после сношения с больным партнером. Сначала ощущается дискомфорт в мочеиспускательном канале, через несколько часов появляются зуд, жжение и гнойные выделения желтовато-зеленого цвета.

У женщин инкубационный период длится 1-3 недели и обычно протекает бессимптомно, что приводит к редкой выявляемости заболевания на ранних стадиях и высокой частоте осложнений.

Для женщин к тому же гонорея опасна тем, что при длительном течении болезни микроорганизмы распространяются на органы малого таза, вызывая воспаление придатков матки – яичников и маточных труб (аднексит, сальпингит), что в конечном итоге может привести к бесплодию. У новорожденных чаще наблюдается поражение глаз, которое может приводить к слепоте. У мужчин также при длительном течении поражается яичко и его придаток (орхит, эпидидимит), что может привести к бесплодию.

Лечение гонореи

В последнее время подходы к терапии гонореи претерпели серьезные изменения. В основном это связано с развитием устойчивости гонококков ко многим антибактериальным препаратам. Поэтому лечение должно проводиться строго под контролем врача по результатам проведенных анализов. Доказательством успешно проведенной терапии является исчезновение клинической симптоматики и отсутствие выделения гонококков по результатам лабораторных исследований. Во время лечения пациенты должны воздерживаться от половых отношений и соблюдать определенную диету – ограничение острой, жирной, копченой пищи, йогуртов с бифидокультурами.



ГБУЗ «Оренбургский областной центр
медицинской профилактики»
Адрес: 460040, г. Оренбург,
ул. Алтайская, д. 12 «а»
god42@mail.orb.ru

АНО «ЦСИ «Развитие»
Адрес: 460044, г. Оренбург,
ул. Березка, д. 26, офис 2
socialinfo@yandex.ru

Профилактика инфекций, передающихся половым путем

Главные аспекты профилактики:

- ◆ не допускайте случайных половых контактов;
- ◆ используйте защищенные половые контакты;
- ◆ не занимайтесь самолечением.

Одним из действенных профилактических средств предупреждения инфекций, передающихся половым путем, является презерватив. При этом необходимо помнить о важных вещах – например, о сроках хранения, способах применения, одновременно не забывая о том, чтобы использовать его во всех вариантах секса.

При возникновении симптомов заболевания – особенно после половой связи – необходимо сразу обращаться к врачам-дерматовенерологам Оренбургского областного кожно-венерологического диспансера по адресу: ул. Парижской Коммуны, 33.

**Телефон
регистратуры
для записи
на прием:**

**8(3532)37-31-73,
57-20-99**

