



ГБУЗ «Оренбургский областной центр
медицинской профилактики»
Адрес: 460040, г. Оренбург,
ул. Алтайская, д. 12а
god42@mail.orb.ru

АНО «ЦСИ «Развитие»
Адрес: 460044, г. Оренбург,
ул. Березка, д. 26, офис 2
socialinfo@yandex.ru

Профилактика инфекций, передающихся половым путем

Главные аспекты:

**не допускайте случайных половых контактов;
используйте защищенные половые контакты;
не занимайтесь самолечением.**

Одним из действенных профилактических средств предупреждения инфекций, передающихся половым путем, выступает презерватив. При этом необходимо помнить о сроках хранения, правилах применения, одновременно не забывая использовать его во всех вариантах секса. При возникновении симптомов заболевания, особенно после половой связи, необходимо сразу обращаться к врачам-дерматовенерологам!

**ГБУЗ «Оренбургский
областной
кожно-венерологический
диспансер»:
г. Оренбург, ул. Парижской
Коммуны, 33.
Телефоны регистратуры:
8(3532)37-31-73,
8(3532)57-20-99.**





ГБУЗ «Оренбургский областной центр
медицинской профилактики»
Адрес: 460040, г. Оренбург,
ул. Алтайская, д. 12а
god42@mail.orb.ru

АНО «ЦСИ «Развитие»
Адрес: 460044, г. Оренбург,
ул. Березка, д. 26, офис 2
socialinfo@yandex.ru

ОСТОРОЖНО: ОПАСНЫЕ СВЯЗИ!

Инфекции, передающиеся половым путем, – группа клинически неоднородных болезней, которые объединяет преимущественно половой путь передачи. В настоящее время зарегистрировано более двадцати ИППП. Это – собственно венерические болезни и урогенитальные инфекции.

Наиболее распространенными венерическими болезнями в России являются сифилис и гонорея. Урогенитальные инфекционные процессы включают: хламидиоз, трихомониаз, генитальный герпес, гепатиты В и С, остроконечные кондиломы (кондиломатоз) и другие.

Инфекциям, передаваемым половым путем, чаще всего подвержены молодые люди 15-24 лет. На этот возраст приходится также половина всех новых случаев инфицирования ВИЧ. Юные девушки в этом отношении наиболее уязвимы из-за своего низкого статуса – зачастую их принуждают к половой жизни, а они не в состоянии убедить старшего полового партнера пользоваться презервативом.

Риск, связанный с ИППП, особенно велик:

- для молодых людей, которые начали половую жизнь в раннем возрасте, поскольку в этом случае более вероятно, что они будут менять половых партнеров;
- для подростков, живущих и работающих на улице, у которых секс стал источником средств к существованию;
- для замужних женщин, мужа которых вступают во внебрачные половые связи.

Опасность ИППП заключается в следующем:

- при отсутствии лечения болезни легко переходят в хронические формы, поэтому терапия существенно затрудняется, а одно из самых неприятных осложнений – бесплодие;
- инфекции переносятся от больной матери к ребенку во время беременности, родов и при грудном вскармливании;
- больной опасен для своих половых партнеров.

Основные проявления ИППП:

- зуд и жжение в области половых органов;
- необычные кровотечения или выделения из половых органов;
- покраснение, язвочки или бородавки в области половых органов и заднего прохода;
- частое болезненное мочеиспускание.