



ГБУЗ «Оренбургский областной центр
медицинской профилактики»
Адрес: 460040, г. Оренбург,
ул. Алтайская, д. 12 «а»
god42@mail.orb.ru

АНО «ЦСИ «Развитие»
Адрес: 460044, г. Оренбург,
ул. Березка, д. 26, офис 2
socialinfo@yandex.ru

Сифилис: симптомы и профилактика

Многие люди думают, что заразиться сифилисом можно даже при пожатии руки, поцелуе, что на самом деле далеко не так. Эта болезнь опасна другим – ее трудно заметить. Ведь от момента заражения до появления первых симптомов может пройти 2-6 недель. В этот период болезнь активно поражает организм. Потом в месте проникновения возникает несколько небольших язвочек с плотным дном. Они могут появиться на головке полового члена, на вульве, во рту, в районе ануса – в зависимости от того, каким был секс с инфицированным партнером. Женщинам намного труднее найти у себя сифилитический шанкр, так как он может образоваться на шейке матки, и увидеть его может лишь врач-гинеколог во время осмотра. Через 1-2 недели после появления язв увеличиваются ближайшие к язвам лимфатические узлы – паховые, подчелюстные. После этого язвы самостоятельно заживают за 3-6 недель, и человека ничего не беспокоит просто потому, что никаких видимых симптомов не остается. В этом главная опасность сифилиса – его начальные стадии протекают настолько легко и безболезненно, что не каждый может заподозрить у себя данную болезнь.

После заживления язв проходит примерно 4-10 недель, и начинается период вторичного сифилиса. Он длится 2-5 лет. Первые симптомы в этот период – сыпь по всему телу. Ее бледно-розовые звезды возникают даже на ладонях и ступнях. Сыпь сопровождается плохим самочувствием, повышенной температурой. Теперь увеличиваются лимфоузлы по всему телу, а на половых органах появляются кондиломы – обширные разрастания на коже.

Вторичный сифилис протекает с обострениями и длительными ремиссиями (когда все симптомы болезни исчезают). Если больной не обратится за помощью, с годами симптомы будут нарастать, и сифилис перейдет в свою последнюю стадию. От начала заболевания и до развития третичного сифилиса проходит примерно 10 лет (при отсутствии лечения).

В третичном сифилисе бледная трепонема поражает нервную систему больного. Третичный сифилис вызывает параличи, глухоту, сумасшествие. У больного образуются гуммы – узлы под кожей. В отсутствие лечения третичный сифилис может привести даже к смерти.

*Поэтому очень важно своевременно
обратиться к врачу!*



ГБУЗ «Оренбургский областной центр
медицинской профилактики»
Адрес: 460040, г. Оренбург,
ул. Алтайская, д. 12 «а»
god42@mail.orb.ru

АНО «ЦСИ «Развитие»
Адрес: 460044, г. Оренбург,
ул. Березка, д. 26, офис 2
socialinfo@yandex.ru

Профилактика инфекций, передающихся половым путем

Главные аспекты профилактики:

- не допускайте случайных половых контактов;
- используйте защищенные половые контакты;
- не занимайтесь самолечением.

Одним из действенных профилактических средств предупреждения инфекций, передающихся половым путем, является презерватив. При этом необходимо помнить о важных вещах – например, о сроках хранения, способах применения, одновременно не забывая о том, чтобы использовать его во всех вариантах секса.

При возникновении симптомов заболевания – особенно после половой связи – необходимо сразу обращаться к врачам-дерматовенерологам Оренбургского областного кожно-венерологического диспансера по адресу: ул. Парижской Коммуны, 33.

**Телефон
регистратуры
для записи
на прием:
8 (3532) 37-31-73,
57-20-99**

